

Uprawy polowe roślin rolniczych

ELPLON może być stosowany pod wszystkie uprawy polowe roślin rolniczych jesienią lub wiosną, jesienią przed siewem i sadzeniem roślin w dawce do 12 t/ha rocznie na glebach o niskiej zasobności w fosfor. Na glebach o średniej lub wysokiej zawartości fosforu – 10 t/ha jeden raz w okresie 2 lat.

Rekultywacja gruntów zdegradowanych

Do rekultywacji gruntów rolnych stosować w dawce do 20t/ha rocznie aż do uzyskania właściwego poziomu ich żyzności.

Przed sadzeniem drzew/krzewów – maksymalna dawka środka to 10 t/ha.

W sadzie/plantacji

Co roku, wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji) – do 8 kg na 10 m².

Rośliny ozdobne

Rośliny rabatowe – wiosną lub przed sadzeniem roślin – 1,5 kg na 1 m², W kolejnych latach uprawy, stosować corocznie jednorazowo.

Rośliny doniczkowe i balkonowe

Dokładnie wymieszać środek z glebą lub innym podłożem w proporcji 4:1 (4 części gleby/podłoża, 1 część środka).

Drzewa i krzewy ozdobne

Podczas sadzenia wymieszać środek z ziemią z dołka w proporcji 3:1 (3 części gleby/podłoża, 1 część środka).

Zakładanie trawników

Przed wysianiem trawy – 20 kg środka na 10 m² powierzchni. Na starszych trawnikach po koszeniu – 5–10 kg środka na 10 m².

Rośliny warzywne

Przed wysiewem nasion/sadzeniem rozsady warzyw – 14 t/ha (14 kg/10 m²). Stosować tylko jesienią pod przedplon, raz na 2–3 lata na tym samym polu. Nie stosować środka w czasie wegetacji roślin. Środka nie stosować w uprawach warzyw pod osłonami w uprawie warzyw korzeniowych i cebulowych, a także innych gatunków (np. zioła, sałata, szpinak, ogórek, dynia, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa i inne), których części jadalne mają bezpośredni kontakt z glebą.

Użytki zielone

W trakcie zakładania łąk lub pastwisk położonych na glebach mineralnych stosować w dawce do 25 t/ha, a na glebach organicznych nie przekraczając 10 t/ha. Na łąkach stosować całorocznie wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji lub jesienią po jej zakończeniu w dawkach 20 t/ha na glebach mineralnych i 15 t/ha w warunkach gleb organicznych. W użytkowaniu pastwiskowym stosować w dawkach do 12 t/ha, najlepiej co dwa lata, w terminie jesiennym.

1 tona środka zawiera co najmniej:

- 5 kg azotu (N)
- 2 kg fosforu (P₂O₅)
- 2 kg potasu (K₂O)
- 110,7 kg substancji organicznej.

Środek należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni ziemi, następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

Nie przewiduje się łącznego stosowania środka poprawiającego właściwości gleby z środkami ochrony roślin.